


REGISTRO REGIONALE EMILIANO-ROMAGNOLO DEI PAZIENTI UREMICI IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO

Report 2002

Report 2002



PAZIENTI 4.059.416

PAZIENTI DI RILIEVO DATI 14

4

48

PERCENTUALE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO 802.1 (RRT) 615.8 (EC+DP)

PERCENTUALE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO 139.2



Report 2002

Consistenza del Registro

al 31.12.2002


	N°	%
• Emodialisi Ospedaliera	1407	43.2
• Emodialisi Domiciliare	7	0.2
• Emodialisi in CAL, CAD, SODD	869	26.7
• CAPD	138	4.2
• DP Ospedaliera	79	2.4
• Trapianto	756	23.2
TOTALE	3256	100

PREVALENZA TERAPIA DIALITICA

(EC + DP)

DISTRIBUZIONE per PROVINCIA


N/pmp






Report 2002

Prevalenza in RRT




Pazienti prevalenti negli anni 1982 – 2002
Registro Emiliano-Romagnolo, Report 2002

ETA' MEDIA NUOVI PAZIENTI (RRT)



Età media dei pazienti incidenti negli anni 1982 – 2002
Registro Emiliano-Romagnolo, Report 2002

Pazienti Prevalenti: primi dati Registro e Anni 2000





Report 2002


POPOLAZIONE PREVALENTE:

(Extracorporea, Peritoneale, Trapianto)

Numero pazienti, sesso, tipo di trattamento

3256


M=2034 F=1222
(62.5%) (37.5%)




POPOLAZIONE PREVALENTE: TERAPIA SOSTITUTIVA SUDDIVISIONE IN BASE AL SESSO

Report 2002


EC
2283



DP
217




Tx
756






POPOLAZIONE PREVALENTE TIPO DI TERAPIA SOSTITUTIVA SUDDIVISA PER FASCE DI ETA' (%)




Pazienti prevalenti in dialisi (EC – DP): età dialitica – età trapianto

Report 2002



DIALISI EXTRACORPOREA: DISTRIBUZIONE IN BASE ALLA SEDE DI TRATTAMENTO





POSITIVITA' SIEROLOGICHE

HCV

EC

14.2%

DP

7.8%

TX

15.6%

HBsAg

EC

2.47%

DP

1.39%

TX

2.46%



Report 2002




POPOLAZIONE PREVALENTE DISTANZA DAL CENTRO E MEZZO DI TRASPORTO

	EC	DP
Distanza media dal Centro (km)	11.03	18.4




Mezzo di trasporto:

- auto propria	33.2%	43.9%
- auto con accompagnatore	18.0%	24.5%
- ambulanza	7.1%	10.4%
- servizio ASL	13.6%	0.92%
- non indicato	22.7%	18.8%
- mezzo pubblico	5.4%	1.4%




Popolazione incidente:

Nuovi ingressi, sesso, trattamenti assegnati



Popolazione incidente: numerosità (%) per fasce di età






Report 2002

POPOLAZIONE INCIDENTE

ETA' MEDIA E CLASSI DI ETA': VARIAZIONI ANNUALI

CLASSE D'ETA'




à media

63 63 65.2 65.6 65.9 64.3 65.6 66 66.9

Fig

POPOLAZIONE INCIDENTE: 565 PAZIENTI

DISTRIBUZIONE DEI FATTORI DI COMORBIDITA'





Report 2002


Popolazione incidente:

Suddivisione per fasce di età e trattamento

	EC	DP
Fasce di età	%	%
0-15	0.9	0.2
16-25	1.1	0.4
26-45	7.3	1.3
46-65	24.5	1.8
66-75	21.8	1.8
> 75	33.7	4.8

Popolazione incidente:


Distribuzione per fasce di età in EC e in DP




Fasce di età (aa)

Fig

PAZIENTI INCIDENTI: TITOLO DI STUDIO




POPOLAZIONE INCIDENTE: NUMERO PAZIENTI PER NEFROPATIA



DISTRIBUZIONE DELLE NEFROPATIE NELLA POPOLAZIONE INCIDENTE: VARIAZIONI ANNUALI

- Altre
- Congenite/ereditarie
- Diabete
- End-stage
- Glomerulari
- Interstiziali
- Sistemiche
- Vascolari



INTERVALLO MEDIO IN ANNI INTERCORSO TRA IL MOMENTO DELLA DIAGNOSI DI NEFROPATIA E L'INIZIO DELLA TERAPIA RENALE SOSTITUTIVA

Nefropatia

Cong/Eredit

Diabete I

Diabete II

ESRD

Glomerulari


Interstiziali

Sistemica

Vascolare


Altre

Anni




CONTROLLI CLINICI ED INTERVALLO INTERCORSO TRA IL MOMENTO DELLA DIAGNOSI DI NEFROPATIA ED INIZIO DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA

Anni



INTERVALLO MEDIO IN ANNI INTERCORSO TRA LA FORMULAZIONE DELLA DIAGNOSI DI NEFROPATIA E L'INIZIO DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE



TECNICHE DIALITICHE



Report 2002

Popolazione incidente

Popolazione prevalente



EC: 507

EC: 2283



DP: 56


DP: 217




ACCESSO VASCOLARE

Report 2002

Pz. prevalenti



Pz. incidenti






Report 2001

MORTALITA'

	Decessi N°	Gross mortality %
<i>Totale</i>	486	15.1%
Uomini	303	15.2%
Donne	183	14.7%
EC	437	19.3%
DP	38	17.4%
TX	11	1.5%


GROSS MORTALITY per CLASSI di ETA'






Report 2002

GROSS MORTALITY per CLASSI di ETÀ NELLA POPOLAZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA NEL 2002




DISTRIBUZIONE DEI DECESSI per CLASSI di ETÀ'




Gross Mortality: 1994 e Anni 2000

Report 2002




CAUSE DI DECESSO






Report 2002

MORTALITA' BRUTA IN RAPPORTO ALLA PRESENZA DI FATTORI DI COMORBIDITA'




MORTALITA' : DIABETICI E NON DIABETICI NELLE VARIE CLASSI DI ETA'




MORTALITA' ed ETA' DIALITICA

Report 2002

Decessi in **EC**



Decessi in **DP**






Report 2002

MORTALITA' A 1 ANNO DI DIALISI

	EC	DP
N°	130	15
%	29.7	39.5
Età media	75	79


MORTALITA' A 1 ANNO DI DIALISI

Principali fattori comorbidi



MORTALITA' A 1 ANNO DI DIALISI

Cause di morte



MORTALITA' A 1 ANNO DI DIALISI

